BULLETIN OF BOTANICAL RESEARCH

第8卷 第4期
Vol.8, No.4

1988年10月
Oct., 1988

中国黄连一新变种

孔 文 彦

A NEW VARIETY OF COPTIS CHINENSIS FRANCH FROM CHINA

Kong ken-yna

〔提要〕 本文发表了中国黄连一新变种，即狭裂黄连 *Coptis Chinensis* var. *angustiloba* W. Y. Kong.

狭裂黄连 花叶黄连（四川合江）、光连（药材）新变种 图

图 狭裂黄连 Coptis chinensis Franch var. angustiloba W. Y. Kong
1. 植株；2. 萼片和花瓣.

Coptis chinensis Franch var. **angustiloba** W. Y. Kong. var. nav.

A var. *C. chinensis* foliis ad 16 cm latis, trisectilis parces pinnati angustilobis interstitis 8-12 mm. suprafoliis eitheris pinnatifidis aperturis deorsum flavidis - albenis - macu - latis., sepalis angusti-ellipticis 8-9 mm longa. 1.2-1.5 mm lotitudes. basalis angustatis differt.

Sichuan, Hejiang, Zi—huai—xiang, Wu—Guo—Cun, Shi—Zhu—Wan, 1980. 1. 18, W. Y. Kong 80—001 (Typus, in Sichuan school of chinese Materia Medica), ibid. W. Y. kong 80—003, 80—004。

Habitat in monotosis umbrosis sylveticis or rupes supra alt 800—1400 m, distributio in sichuan of Hejiang.

本文作者工作单位：四川，重庆中药材公司 (Company of chinese crtde Drugs of chongqing Sichuan).
承蒙北京医科大学诚静容教授审阅文稿，贺素英（四川省中药研究所）同志绘图，作者谨致谢意.

Xuyong. gulin. jiangjin et guizhou of chishui.

本变种叶宽达 16 cm，全裂片稀羽状狭裂，羽裂片彼此距离 8—12 mm，叶面各羽裂口下均具黄白色斑点；萼片狭椭圆形，长 8—9 mm，宽 1.2—1.5 mm，基部变狭可区别。

四川：合江，自怀乡，卫国村，石柱湾，1980年 1 月18日，孔文彦 80—001（模式标本，存四川省中药学校），同地同时，孔文彦80—003，80—004。

生于海拔 800—1400 m 山地林荫下或岩石上，分布于四川合江、叙永、古蔺、江津及贵州的赤水等地。